Raport

Le memoire, et Les observations de M.r Laflize M.e En chirurgie a nancy Sur vne hernie Inguinalle, et Sur de fausses hernies, Dont Lacademie ma chargé de lui rendre compte. ont a pour objet La sortie incomplette des testicules retenüe dans Laine, et prises pour Des hernies vraie. Dont Lerreur a souvent occasionnée des accidens Facheux dans la pratique par Lapplication indiscrette des bandages. M.r Laflize commence par faire connaitre comment ces sortes de tumeurs Sannoncent fait vne description anatomiques des testicules, de leurs retenüe dans Le ventre, et de la Variette de Leurs sortie hors de cette cavité. apres quoi il passe aux signes diagnostic, qui font connaître et distingués cette maladie, et pretend quelon netrouvent que des preceptes tres vagues, chez La plus part des anatomistes, et peu dobservations sur les accidens de ces erreurs commises, et apres avoir dit un mot du prognostic, et de la cure, donne six observations quil à recceuillie. Jl et question dans La p.re dun particulier agé de 24 ans qui fut incomodé dune hernie Inguinalle par la sortie de testicule hors du ventre, et qui dessendit dans Le scrotum, cette dessente ne ventra Jamais en totalité, neamoines on faisoit porter au malade vn bandage qui comprimoit, et occasionnoit des douleurs. au bout de 10 ans il survint un etranglement, on fut obligé doperer. on trouva

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE
ARC 14 d-10 n°2

beaucoup dadherence, Letesticule comme atrophié, et pelle melle avec vne portion considerable delileon, pret à se Gangrener. Lemalade mourut 18 heure apres Loperation. Lauteur dit que Lon ne sera pas surpris de Ladherence, si lon fait attention que Lintestin s'etoit jnsinué dans Le sac membranneux destiné à recevoir Letesticule. cela et possible mais cette jnvagination ne me paroit pas bien prouvé, ne voiant pas que Lon ait fait des recherches pour sen assurer.

jl sagit dans La seconde observation d'un enfant de 6 ans qui portoit vne petitte tumeur dans Laine droitte, et qui fut prises par vn chirurgien pour vne dessente, on fit vsage du bandage pendant 6 mois, qui causa des douleurs assés vives, Latumeur augmenta, on consulta de nouveau vn chirurgien et vn frere delacharité, qui firent de nouvelles tentatives pour reduire cette pretendüe hernie, jl survint gouflement on appliqua des Cataplasmes resolutives qui parurent àgraver le mal, enfin avec Le temps Letesticule dessendit dans son lieu naturel, mais plus gros qu'il ne devoit etre, jl si forma vn depot, La suppuration fut abondante, et de mauvaise qualité, jl survint des chairs fongueuses on employa des caustiques, et Lulcere fut abandonné ala nature, et plus ~~deux~~ ans a se cicatriser

Mr Laflize ayant eu occasion de voir cet enfant Lexamina, et reconnue

que la vraie cause de la maladie avoit été ignoré, ce qui lui fut confirmé par la sortie du testicule gauche, avec les mesmes circonstances, que ceux qui accompagnerent celui du cotté droit, mais qui n'eurent aucune suitte facheuse.

La 3e 4e 5e et 6e observation reporté par Mr. Laflize sont tiré de louvrage de Mr Percival pott. anglais, sur les maladies du testicule et que Mr Laflize ne croit pas traduitte en notre langue. elle contiennent des faits relatif a la seconde observation, et peuvent faire connaître les fauttes et meprisent qui arrivent dans la pratique. cette incomodité est tres commune dans tous les âges, j'en aie plusieurs exemple de faits particuliers, qui ont été fort graves.

Je pense que les reflections, et les observations de Mr. Laflize peuvent etre employé par extrait, lorque l'academie aura lieu de traiter cette matiere. Deliberé a paris ce 20 fev. 1771

Lipselet

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE